LIAISON ® Meridian Helicobacter pylori
INSTRUCCIONES AUTO-TOMA DE MUESTRA

Diasorin
The Diagnostic Specialist

VÍDEO CON INSTRUCCIONES

¿Qué se necesita?

Recipiente estéril para heces

Dispositivo para muestra

+

Dispositivo de muestra

Se compone de dos partes enroscables

+

¿Cómo se toma la muestra?

En el momento de la evacuación, recolectar la materia fecal dentro del recipiente estéril para heces.

Consejo: Colocar una película de plástico entre el asiento y la taza del inodoro a modo de filtro. Tras la evacuación, tomar una porción de materia fecal y colocarla en el recipiente estéril.

1. Desenrosque la espátula del dispositivo de extracción con la parte cónica hacia arriba, tal y como se observa en la siguiente imagen.

2. Tome del recipiente estéril una muestra de heces de pequeñas dimensiones con la espátula como se indica a continuación.



3. Enrosque la espátula en el dispositivo de extracción:

4. No se recogerán dispositivos cuya recogida de muestra no sea tal y cómo se indica en el punto 2:

La muestra fresca de heces se deberá entregar en el laboratorio durante las 4 horas posteriores a su toma. Si no fuera posible, conservar la muestra en nevera un máximo de 48h hasta su entrega en el punto de recepción de muestras.